THE

BIRDS

OF

GREAT BRITAIN,

SYSTEMATICALLY ARRANGED, ACCURATELY ENGRAVED,
AND PAINTED FROM NATURE;

WITH DESCRIPTIONS, INCLUDING
THE NATURAL HISTORY OF EACH BIRD:

From Obſervations the Reſult of more than Twenty Years Application to the Subject, in the Field of Nature; in which the diſtinguiſhing Character of each Species is fully explained, and its Manner of Life truly deſcribed.

THE FIGURES ENGRAVED FROM THE SUBJECTS THEMSELVES, BY THE AUTHOR,

W. LEWIN,
FELLOW OF THE LINNÆAN SOCIETY,

AND PAINTED UNDER HIS IMMEDIATE DIRECTION.

IN EIGHT VOLUMES.

VOL. IV.

LONDON:
PRINTED FOR J. JOHNSON, IN ST. PAUL'S CHURCH-YARD.
1797.

LES

OISEAUX

DE LA

GRANDE BRÉTAGNE,

RANGÉS DANS UN ORDRE SYSTÉMATIQUE, GRAVÉS AVEC SOIN, ET PEINTS D'APRÈS NATURE;

AVEC DES DESCRIPTIONS, CONTENANT

L'HISTOIRE COMPLETTE DE CHAQUE OISEAU:

D'Après des Obſervations, qui ſont le Réſultat de plus de vingt Années, employées à ſuivre et à étudier la Nature; où le Caractère diſtinctif de chaque Eſpèce eſt pléinement développé, et où ſes Mœurs et ſes Habitudes naturelles ſont décrites avec Vérité.

LES FIGURES GRAVÉES D'APRÈS LES SUJETS MÊMES, PAR L'AUTEUR,

W. LEWIN,

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE,

ET PEINTES SOUS SES YEUX.

EN HUIT VOLUMES.

VOL. IV.

LONDRE:

CHEZ J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

1797.

THE

BIRDS

OF

GREAT BRITAIN,

WITH THEIR

EGGS.

ORD. III. GENUS XI. WARBLER.

Bill, ſlender and weak.
Nostrils, ſmall and ſunk.
Tongue, cloven.
Toes, the outermoſt joined at the under part of the laſt joint to the middle one.

SPECIES I. FANTAIL WARBLER.

Pl. 98.

The upper mandible of the bill of this ſpecies is duſky, the under whitiſh, with a duſky tip: the general colour of the plumage on the upper part is of an olive brown, interſperſed with dark daſhes: on the under part of a dull yellowiſh white, darkeſt about the breaſt: the tail is compoſed of twelve pointed feathers, the middlemoſt of which are the longeſt, the reſt regularly decreaſing in length to the outer ones, which are the ſhorteſt. This ſhape of the tail diſtinguiſhes it from the graſshopper lark, with which it appears to have been confounded: it has alſo ſome difference in colour, and its hind claw is more crooked.

This ſpecies is not uncommon in this kingdom. It is met with in thick hedges, and not unfrequently among low buſhes and furze, and appears firſt about the middle of April. Its neſt is not unlike that of the white throat, but ſmaller.

FANTAIL WARBLER. W. Lewin del. et sculp.t Published as the Act directs Nov.r 7. 1793.

ORD. III. GENRE XI. CHANTEUR.

Le bec, menu et foible.
Les narines, petites et enfoncées.
La langue, fourchue.
Les doigts, l'extérieur joint au deſſous de la dernière articulation à celui du milieu.

ESPÈCE I. LE CHANTEUR À QUEUE D'ÉVENTAIL.

Pl. 98.

Dans cette eſpèce la mandibule inférieure eſt blanchâtre, la ſupérieure ainſi que le bout du bec ſont d'une couleur ſombre : le plumage ſupérieur eſt en général d'un brun d'olive parſemé de traits foncés ; l'inférieur eſt d'un blanc jaunâtre ſale, plus foncé vers la poitrine : la queue eſt compoſée de douze plumes pointues, les intermédiaires ſont les plus longues, les autres décroiſſant par degrés juſqu'aux extérieures qui ſont les plus courtes. La forme de la queue diſtingue cet oiſeau de l'alouette ſauterelle avec laquelle il paroît qu'on l'a confondu : il différe auſſi de celle-ci pour la couleur, et il a l'ongle poſtérieur plus crochu.

Cette eſpèce n'eſt pas rare en ce royaume. On la trouve dans les haies épaiſſes, et aſſez ſouvent au milieu des petits buiſſons et de la bruyère, et elle paroît pour la première fois vers la mi-Avril. Son nid reſſemble aſſez à celui de la gorge-blanche ; ſeulement il eſt plus petit.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. II. NIGHTINGALE.

Pl. 99.

Motacilla luſcinia. *Lin. Syſt.* I. p. 328.
Le Roſſignol. *Briſ. Orn.* III. p. 397.

The bill of this bird is duſky: the eyes hazel: the head and back reddiſh brown: the tail of a deeper tawny red: the under parts of the body of a pale yellowiſh aſh colour, growing whitiſh towards the vent: the quill feathers, and greater wing-coverts dark reddiſh brown, with light edges. The difference between the male and female is ſcarcely diſcernible.

Few are ignorant of the reputation the nightingale enjoys for ſong, in which it is allowed to be the firſt of its race. It commonly begins to ſing in the evening, and continues through the night; though it muſt be obſerved it ſings likewiſe in the day. It is a ſolitary bird, and keeps out of ſight for the moſt part, being concealed in a hedge or buſh, whence it utters its delightful note. It arrives in England the end of March or beginning of April, and retires about the end of Auguſt, but does not viſit the more northern counties. It makes its neſt in a low buſh, and lays four or five eggs, for which ſee Pl. XXIII. Fig. 2.

NIGHTINGALE. W. Lewin. del. et. sculp.t Published as the Act directs. Nov.r 7. 1792.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. II. LE ROSSIGNOL.

Pl. 99.

Motacilla luſcinia. *Lin. Syſt.* I. p. 328.
Le Roſſignol. *Brif. Orn.* III. p. 397.

Cet oiſeau a le bec de couleur ſombre; l'iris des yeux noiſette; la tête et le dos d'un brun rougeâtre; la queue d'un rouge tanné plus foncé; le deſſous du corps d'un cendré jaunâtre pâle qui devient blanc à meſure qu'il approche du deſſous de la queue; les pennes des ailes ainſi que les grandes couvertures d'un brun rougeâtre foncé avec des bords de couleur claire. Il eſt difficile de diſtinguer le mâle de la femelle.

Peu de perſonnes ignorent la réputation que le roſſignol s'eſt acquiſe par ſon ramage qui lui aſſure la première place parmi les oiſeaux chanteurs. Il commence communément à chanter le ſoir et continue toute la nuit; il eſt bon néanmoins d'obſerver qu'on l'entend auſſi le jour. C'eſt un oiſeau ſolitaire, qu'on voit rarement; il ſe tient caché dans une haie ou un buiſſon; c'eſt de là qu'il fait réſonner ſa voix mélodieuſe. Il arrive en Angleterre à la fin de Mars ou au commencement d'Avril, et il ſe retire vers la fin d'Août, mais on ne le trouve point dans les parties les plus ſeptentrionales. Il fait ſon nid dans un petit buiſſon et y dépoſe quatre ou cinq œufs. Voyez l'œuf Pl. XXIII. Fig. 2.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. III. BLACK-CAP.

Pl. 100.

Motacilla atricapilla. *Lin. Syſt.* I. p. 332.
La Fauvette à tête noire. *Briſ. Orn.* III. p. 380.

The bill of this ſpecies is horn colour: the crown of the head, in the male, black: the back of the neck, and rump, aſh-colour: the back and ſhoulders of a greyiſh green: the quill feathers, and tail, duſky, edged with dull green: the breaſt and upper part of the belly of a light aſh-colour; the lower part, and vent, whitiſh: the legs lead colour.

BLACK-CAP WARBLER. W. Lewis del. et sculp. Published as the Act directs, Nov.r 7 1798.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. III. LA FAUVETTE À TÊTE NOIRE.

Pl. 100.

Motacilla atricapilla. *Lin. Syſt.* I. p. 332.
La Fauvette à tête noire. *Briſ. Orn.* III. p. 380.

Le bec de cette eſpèce eſt couleur de corne: dans le mâle le ſommet de la tête eſt noir: le derrière du col ainſi que le croupion ſont couleur de cendre; le dos et la baſe des ailes d'un verd griſâtre; les grandes plumes des ailes et la queue de couleur ſombre, avec des bords d'un verd terne; la poitrine et le haut du ventre d'un cendré clair; le bas ventre et le deſſous de la queue blanchâtres; les jambes plombées.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. III. FEMALE BLACK-CAP.

Pl. 100*.

This bird differs conſiderably from the male in appearance; the crown of the head being of a ruſty cheſnut colour, the upper parts of the body and wings of a light olive brown, and the white on the under parts having ſomewhat of a dirty yellowiſh caſt.

The black-cap is firſt ſeen with us about the beginning of April, and departs in September. Its ſong is little inferior to that of the nightingale, whence it is called the mock nightingale in Norfolk. It makes its neſt in a low buſh, pretty near the ground, of dried ſtalks of gooſe graſs, mixed with a little wool, and green moſs round the edge, lining it with the fibres of roots, thinly covered with horſe-hair. The eggs are five in number, of a reddiſh brown, clouded with a darker colour, and marked with a few ſpots of black. For the egg, ſee Pl. XXIII. Fig. 1.

FEMALE BLACK-CAP WARBLER. W. Lewis del. et sculp. Published as the Act Directs, Nov.r 7 1793.

ORD. III. GEN XI. CHANTEUR.

ESP. III. FAUVETTE À TÊTE NOIRE FEMELLE.

Pl. 100*.

Cet oiſeau différe beaucoup du mâle en apparence; le ſommet de la tête étant d'un marron ferrugineux, le deſſus du corps et les ailes d'un brun olive clair; et le blanc du plumage inférieur ayant comme une teinte de jaunâtre ſale.

La fauvette à tête noire ne paroît dans ce pays que vers le commencement d'Avril et nous quitte en Septembre. Son ramage eſt un peu au deſſous de celui du roſſignol, ce qui lui a fait donner dans le Norfolk le nom de faux roſſignol. Elle fait ſon nid dans un petit buiſſon, près de terre; le compoſe de tiges sèches de grateron, mêlées avec un peu de laine et de mouſſe verte ſur les bords, et le tapiſſe avec des fibres de racines qu'elle recouvre d'un peu de crin. Les œufs ſont au nombre de cinq, d'un brun rougeâtre, nébulés d'une couleur plus foncée, et ſemés de quelques taches noires. Voyez l'œuf, Pl. XXIII. Fig. 1.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. IV. GREATER PETTY-CHAPS.

Pl. 101.

La Fauvette. *Brif. Orn.* III. p. 372. Var. 1.

This bird is about the ſize of the hedge-warbler: the bill broader than that of the white throat: eyes hazel: the upper parts of the body light greeniſh brown: the under duſky white, inclining to brown on the breaſt: tail duſky: legs lead colour.

It arrives with us about the middle of April, and makes a neſt for the moſt part with fibres of plants and wool, ſometimes with the addition of green moſs. It often builds in the neighbourhood of gardens. The eggs are uſually four in number, of a dirty white colour, blotched and ſpeckled with browniſh. It has a melodious and pleaſing ſong; and in ſome of its notes much reſembles the nightingale.

GREATER PETTY-CHAPS. W. Lewin del. et sculp. Published as the Act directs Nov.r 1.1795.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. IV. LA FAUVETTE.

Pl. 101.

La Fauvette. *Brif. Orn.* III. p. 372. Var. 1.

Cette fauvette eſt à peu de choſe près de la groſſeur de la fauvette de haie: elle a le bec plus large que la gorge-blanche: ſes yeux ſont couleur de noiſette: le plumage ſupérieur eſt d'un brun verdâtre clair, et l'inférieur d'un blanc ſale, tirant au brun ſur la poitrine. La queue eſt de couleur ſombre: les jambes ſont plombées.

Nous voyons arriver cet oiſeau vers le milieu d'Avril; il fait un nid en grande partie compoſé de fibres de plantes, et de laine; quelquefois il y ajoute de la mouſſe verte. Il s'établit quelquefois dans le voiſinage des jardins. Les œufs ſont ordinairement au nombre de quatre, d'un blanc ſale, et marquetés de taches brunâtres. Sa voix eſt agréable et mélodieuſe, et dans pluſieurs de ſes modulations il reſſemble beaucoup au roſſignol.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. V. LESS PETTY-CHAPS.

Pl. 102.

Motacilla Hippolais. *Lin. Syſt.* I. p. 330.
La petite Fauvette. *Briſ. Orn.* III. p. 374.

This ſpecies is ſmaller than the linnet. The bill is ſhort, duſky, and black towards the point of the upper mandible: a line of yellow paſſes over the eyes: the upper parts of the body are of an olive brown: the quill feathers ſomewhat darker, with lighter edges: the under parts of the body ſilvery white, tinged in ſome places with yellow, more particularly on the breaſt: legs brown.

This bird is not uncommon in England, in the ſummer. Its neſt, which it builds on the ground, under a tuft of graſs, or at the bottom of a buſh, is of an arched form, compoſed of dry bents, mixed with a little moſs, and lined with feathers. The eggs are generally five in number, of a white colour, ſprinkled all over with ſmall red ſpots, moſt at the larger end. It is called the hay-bird in Dorſetſhire, and in Yorkſhire the beam-bird.

For the egg, ſee Pl. XXIII. Fig. 4.

LESSER PETTY-CHAPS. W.Lewin. del. et sculp. Published as the Act directs. Nov.r 1 1795.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. V. LA PETITE FAUVETTE.

Pl. 102.

Motacilla Hippolais. *Lin. Syſt.* I. p. 330.
La petite Fauvette. *Brif. Orn.* III. p. 374.

Cette eſpèce eſt plus petite que la linotte. Elle a le bec court, de couleur ſombre et noir vers la pointe de la mandibule ſupérieure: une ligne jaune lui paſſe ſur l'œil: le deſſus du corps eſt d'un brun olive. Les grandes plumes de la queue ſont un peu plus foncées, et d'une couleur plus claire ſur les bords; le deſſous eſt d'un blanc argenté, teint de jaune en quelques endroits, plus particulièrement ſur la poitrine: les jambes ſont brunes.

Cet oiſeau n'eſt pas rare en Angleterre dans l'été. Son nid, qu'il bâtit par terre, ſous une touffe d'herbe ou au bas d'un buiſſon, eſt en forme d'arche, compoſé de brins de jonc ſecs, avec un peu de mouſſe, et garni de plumes. Les œufs ſont en général au nombre de cinq, blancs, parſemés de petites taches rouges, plus fréquentes vers le gros bout. Il a le nom de hay-bird dans le Dorſetſhire, et dans l'Yorkſhire celui de beam-bird.

Voyez l'œuf, Pl. XXIII. Fig. 4.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. VI. HEDGE WARBLER.

Pl. 103.

Motacilla modularis. *Lin. Syſt.* I. p. 329.
La Fauvette de haye, ou Paſſe-buſe. *Briſ. Orn.* III. p. 394.

This ſpecies is ſo common with us in England, at all ſeaſons, and ſo well known, that a minute deſcription can ſcarcely be neceſſary. The upper part of the body is brown, inclining to aſh colour in ſome places, and interſperſed with duſky ſpots: the throat and breaſt are of a dull aſh colour: the belly of a dirty white: the legs of a dull fleſh colour. The male and female are much alike, but the colours of the latter are more dull.

It makes its neſt in hedges, compoſing it of moſs and wool, and lining it with hair. It remains with us throughout the winter. The eggs are four or five in number, of a fine pale blue, not unlike thoſe of the redtail, but ſomewhat more round, and larger. This bird is commonly known by the name of the hedge-ſparrow.

For the egg, ſee Pl. XXIII. Fig. 3.

HEDGE WARBLER. W. Lewin del. & sculp. Publish'd as the Act directs. Nov.r 7. 1793.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. VI. LA FAUVETTE DE HAIE.

Pl. 103.

Motacilla modularis. *Lin. Syſt.* I. p. 329.
La Fauvette de haie, ou Paſſe-buſe. *Briſ. Orn.* III. p. 394.

On rencontre ſi ſouvent cette eſpèce en Angleterre dans toutes les ſaiſons, et on la connoît ſi bien qu'une légère deſcription ſemble à peine neceſſaire. Le deſſus du corps eſt brun, tirant au cendré en quelques endroits, et parſemé de taches de couleur ſombre : la gorge et la poitrine ſont d'un cendré terne : le ventre eſt d'un blanc ſale : les jambes ſont couleur de chair terne. Le mâle et la femelle ſe reſſemblent beaucoup, mais les couleurs de cette dernière ſont d'une teinte plus ſombre.

Elle place ſon nid dans les haies ; il eſt fait de mouſſe ainſi que de laine, et tapiſſé de poils. Elle ne nous quitte point pendant tout l'hiver. Les œufs ſont au nombre de quatre à cinq, d'un beau bleu pâle, et aſſez ſemblables à ceux du rouge-queue ; ſeulement ils ſont tant ſoit peu plus ronds et plus gros. Cet oiſeau eſt communément appellé moineau de haie.

Voyez l'œuf, Pl. XXIII. Fig. 3.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. VII. RED-TAIL.

Pl. 104.

Motacilla phænicurus. *Lin. Syſt.* I. p. 335.
Le Roſſignol de muraille. *Briſ. Orn.* III. p. 403.

This bird is about the ſize of the hedge warbler. The bill is black: the forehead white: the crown of the head, hind part of the neck, back, and ſhoulders, deep blue grey; in ſome birds approaching to black: the quill feathers brown, with pale edges: cheeks and throat black: breaſt, rump, and ſides, red: belly whitiſh: the two middle feathers of the tail reddiſh brown, the others red: legs black.

In the female the top of the head, the back, and the lower ſide of the neck, are of a deep aſh colour: the chin white: and the red parts are of a duller hue.

This bird has a fine ſoft note, but is ſullen, and not eaſily kept alive in confinement. It is very ſhy, yet generally builds in ſome hole of a wall, or hollow of a tree, near habitations, and often in gardens, making its neſt chiefly of moſs, lining it with hair and feathers, and laying ſix or eight eggs, not unlike thoſe of the hedge warbler, but more taper.

For the egg, ſee Pl. XXIV. Fig. 2.

RED TAIL. T.Lewin del. et sculp.t Published as the Act directs, Nov.r 7, 1793.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. VII. LE ROUGE-QUEUE.

Pl. 104.

Motacilla phœnicurus. *Lin. Syſt.* I. p. 335.
Le Roſſignol de muraille. *Briſ. Orn.* III. p. 403.

Cet oiſeau eſt à peu près de la groſſeur de la fauvette de haie. Il a le bec noir; le front blanc; le ſommet de la tête, le derrière du col, le dos, et la baſe des ailes d'un gris bleu foncé, qui, dans quelques individus, tire ſur le noir; les grandes plumes de l'aile brunes et bordées d'une couleur pâle; les joues et la gorge noires; la poitrine, le croupion et les côtés rouges; le ventre blanchâtre; les deux plumes du milieu de la queue d'un brun rougeâtre, les autres étant rouges; et les jambes noires.

Dans la femelle le haut de la tête, le dos, et le bas du col ſont d'un cendré foncé: le deſſous de la tête eſt blanc; et les parties de couleur rouge ſont d'une teinte plus ſombre.

Le rouge-queue a un ramage doux et gracieux; mais il eſt triſte, et rarement il vit dans l'état de captivité. Il eſt très ſauvage, cependant en général il fait ſon nid dans un trou de muraille ou d'arbre, près des lieux habités, et ſouvent dans les jardins; il le compoſe principalement de mouſſe, et le tapiſſe de poils et de plumes; la femelle y dépoſe depuis ſix juſqu'à huit œufs, qui reſſemblent aſſez a ceux de la fauvette de haie, avec cette différence qu'ils ſont d'une forme plus conique.

Voyez l'œuf, Pl. XXIV. Fig. 2.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. VIII. WHITE THROAT.

Pl. 105.

La méſange cendrée. *Brif. Orn.* III. 549.

The length of this bird is full five inches and half. The head is of a brownifh aſh-colour: the throat white: the back and ſhoulders brown, inclining to red: the wing coverts brown, with reddiſh margins: tail and quill feathers duſky, with pale brown edges: breaſt, and belly, white, tinged with red: legs pale brown.

In the female the breaſt and belly are wholly white.

This ſpecies viſits us in the ſpring, and leaves us in autumn. During the ſummer it frequents hedges and gardens, making a neſt two or three feet from the ground, compoſed of moſs and dry ſtalks. The eggs are uſually five in number, for which ſee Pl. XXIV. Fig. 1.

WHITE THROAT. T.Lewin, del. et sculp.t Published as the Act directs, Nov.r 1.1793.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. VIII. LA GORGE-BLANCHE.

Pl. 105.

La méſange cendrée. *Brif. Orn.* III. p. 549.

La longueur de cet oiſeau eſt de cinq pouces et demi. La tête eſt d'un cendré brunâtre; la gorge blanche: le dos et la baſe des ailes ſont d'un brun tirant au rouge; les couvertures des ailes rouges, avec des bords rougeâtres; la queue et les pennes de couleur ſombre et bordées d'un brun pâle; la poitrine et le ventre blancs et teints de rouge; les jambes d'un brun pâle.

Dans la femelle la poitrine et le ventre ſont entièrement blancs.

Cette eſpèce arrive en ce pays au printemps et nous quitte en automne. Durant l'été elle fréquente les haies et les jardins, faiſant à deux ou trois pieds de terre un nid compoſé de mouſſe et de tiges sèches. Les œufs ſont ordinairement au nombre de cinq. Voyez l'œuf, Pl. XXIV. Fig. 1.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. IX. LESS WHITE THROAT.

Pl. 106.

La Fauvette griſe, ou la Griſette. *Briſ. Orn.* III. p. 376.

This bird is conſiderably ſmaller than the preceding, and differs from it in the colour of its plumage, though there is ſomething of a general reſemblance. The head is aſh-coloured: the back and ſhoulders light brown: the wings and tail ſomewhat darker, the quill feathers edged with pale brown, and the outer vane and part of the inner vane of the outermoſt feathers of the tail white: the rump is of a browniſh colour: the throat, breaſt, and belly, white: the legs and beak lead colour.

The leſs white throat makes a very ſimple neſt of a little dry graſs at the extremity of ſome projecting branch of a buſh, at no great diſtance from the ground. The eggs reſemble thoſe of the greater white-throat, except in ſize, and being of a ſomewhat paler hue: ſee Pl. XXIV. Fig. 4.

LESSER WHITE THROAT. J.W.Lewin,del.et sculp.t Published as the Act directs. Nov.t 7. 1793.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. IX. LA GRISETTE.

Pl. 106.

La Fauvette griſe ou la Griſette. *Brif. Orn.* III. p. 376.

Cet oiſeau eſt beaucoup plus petit que le précédent et en différe par la couleur du plumage, quoiqu'en général il y ait entre l'un et l'autre quelque reſſemblance. La tête eſt cendrée: le dos et la baſe des ailes ſont d'un brun clair: les ailes et la queue ſont tant ſoit peu plus foncées, les pennes des ailes bordées d'un brun pâle, et les barbes extérieures ainſi qu'une partie des intérieures des plumes les plus extérieures de la queue de couleur blanche: le croupion eſt brunâtre: la gorge, la poitrine et le ventre ſont blancs; les jambes et le bec couleur de plomb.

La griſette conſtruit un nid très ſimple avec de l'herbe sèche à l'extrémité d'une branche avancée d'un buiſſon aſſez près de terre. Les œufs reſſemblent à ceux de la gorge-blanche, excepté pour la groſſeur, ainſi que pour la couleur qui eſt un peu plus pâle. Voyez l'œuf, Pl. XXIV. Fig. 4.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. X. SEDGE WARBLER.

Pl. 107.

Motacilla ſalicaria. *Lin. Syſt.* I. 330.
La Fauvette babillarde. *Briſ. Orn.* III. p. 384.

This ſpecies is nearly of the ſize of the black-cap, but more ſlender. The bill is black: the head brown, with duſky ſpots: over the eye is a line of white: back part of the neck brown: back and ſhoulders of a ſlightly reddiſh brown, ſpotted with black: coverts of the wing duſky, edged with pale brown: quill feathers duſky: tail brown, and rounded in ſhape: coverts of the tail tawny: throat, breaſt, and belly, white, tinged with yellow.

This bird is ſufficiently common with us in England, and frequents the places where reeds grow, among which it generally makes its neſt. It ſings with a variety of notes, in imitation of thoſe of other birds, and chiefly in the night. Its neſt is compoſed of ſtraw and dry fibres of plants, and lined with hair: the eggs uſually five, for which ſee Pl. XXIV. Fig. 3.

SEDGE WARBLER. I.W.Lewin. del. et sculp.t Published as the Act directs. Nov.r 7. 1793.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. X. LA FAUVETTE BABILLARDE.

Pl. 107.

Motacilla ſalicaria. *Lin. Syſt.* I. 330.
La Fauvette babillarde. *Briſ. Orn.* III. p. 384.

Cette eſpèce eſt preſque de la taille de la fauvette à tête noire, mais plus effilée. Le bec eſt noir; la tête brune avec des taches ſombres: il y a ſur l'œil une ligne blanche: le derrière du col eſt brun: le dos et la baſe des ailes ſont d'un brun légèrement rougeâtre, tacheté de noir: les couvertures de l'aile ſont de couleur ſombre et bordées de brun pâle; les pennes ſont auſſi de couleur ſombre: la queue eſt brune et arrondie; les couvertures de la queue ſont de couleur tannée: la gorge, la poitrine et le ventre ſont blancs et teints de jaune.

Cet oiſeau eſt aſſez commun en Angleterre, et fréquente les endroits où croiſſent les roſeaux, au milieu deſquels ſon nid eſt ordinairement placé. Son chant a une variété de tons qui imitent ceux des autres oiſeaux; on l'entend ſurtout la nuit. Il conſtruit ſon nid de paille jointe à des fibres de plantes sèches, avec un lit de crin; il y dépoſe communément cinq œufs. Voyez l'œuf, Pl. XXIV. Fig. 3.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. XI. DARTFORD WARBLER.

Pl. 108.

This bird is ſcarcely bigger than the wren, though it meaſures five inches in conſequence of the length of its tail. The bill is black with a whitiſh baſe: the eyes red; eyelids deep crimſon: the upper part of the head, neck, and body, reddiſh brown: the throat, breaſt, and belly, of a deep ruddy ruſt colour: the middle of the belly white, and the throat marked with white ſpots: the quill feathers edged with white: the baſtard wing white: the tail brown, the outer web of each extreme feather white: the legs yellow.

This is not a very common ſpecies in England, and only to be met with on the heaths and dry ſpots. It feeds on inſects, and has much of the action of the common fly-catcher. The neſt and egg are not yet known in England, and it is by no means certain whether the bird breed in the ſouthern parts of the kingdom or not.

DARTFORD WARBLER. J.W. Lewin. del. et sculp.t Publish'd as the Act directs, Nov.r 7. 1793.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. XI. LE CHANTRE DE DARTFORD.

Pl. 108.

Cet oiſeau ſurpaſſe à peine le troglodyte en groſſeur, quoique, en y comprenant ſa longue queue, il ſoit long de cinq pouces. Le bec noir eſt blanchâtre à ſa baſe: les yeux ſont rouges, et les paupières d'un cramoiſi foncé; le deſſus de la tête, le col et le corps d'un brun rougeâtre; la gorge, la poitrine et le ventre couleur de rouille rougeâtre foncée: le milieu du ventre eſt blanc et la gorge marquée de taches blanches: les grandes pennes ſont bordées de blanc: l'aile bâtarde eſt blanche; la queue brune, les barbes extérieures de chacune des dernières plumes ſont blanches: les jambes ſont jaunes.

Cette eſpèce n'eſt pas très répandue en Angleterre; on la trouve ſeulement dans les bruyères et dans les lieux ſecs. Elle vit d'inſectes et tient beaucoup, quant à ſes mouvements, du gobe-mouche vulgaire. Nous ne connoiſſons encore en Angleterre ni le nid ni les œufs de cet oiſeau, et il n'eſt nullement certain s'il multiplie ou non dans le midi de ce royaume.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. XII. RED BREAST.

Pl. 109.

Motacilla rubecula. *Lin. Syſt.* I. p. 337.
Le Rouge-gorge. *Briſ. Orn.* III. p. 418.

Little need be ſaid of this ſpecies, being every where ſeen and known throughout England. The general colour is browniſh aſh, tinged with green; the wings rather darker, inclining to yellow on the edges of the feathers: the forehead, chin, throat, and breaſt, are of an orange red: the belly, and vent, whitiſh.

This is a familiar bird, frequenting the neighbourhood of houſes and gardens, and often coming into houſes in the winter, if the windows be left open, boldly picking the crumbs from the table. The neſt is often made in a buſh, not far from the ground, and ſometimes in ſome retired part of an old building. It is compoſed of dried leaves, mixed with hair and moſs, and lined with feathers. It lays from five to ſeven eggs, of a duſky reddiſh white, marked with irregular reddiſh ſpots, and of a roundiſh ſhape, as repreſented in Pl. XXV. Fig. 1.

RED BREAST. I.W.Lewin, del. et. sculpt. Published as the Act directs, Nov.r 7. 1795.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. XII. LE ROUGE-GORGE.

Pl. 109.

Motacilla rubecula. *Lin. Syſt.* I. p. 337.
Le Rouge-gorge. *Brif. Orn.* III. p. 418.

Il n'eſt pas néceſſaire de beaucoup s'étendre ſur cette eſpèce; car on la voit partout, et tout le monde la connoît en Angleterre. La couleur générale eſt un cendré brunâtre, teint de verd: les ailes ſont un peu plus foncées, tirant au jaune ſur les bords des plumes: le front, le deſſous de la tête, la gorge et la poitrine ſont d'un rouge orangé: le ventre et le deſſous de la queue ſont blanchâtres.

Cet oiſeau eſt familier, fréquentant le voiſinage des jardins, des maiſons où il entre ſouvent en hiver, lorſque les fenêtres ſont ouvertes, et ramaſſe les miettes de la table. Le nid eſt ſouvent fait dans un buiſſon près de terre, et quelquefois dans une partie retirée d'un vieux bâtiment. Il eſt compoſé de feuilles sèches mêlées de crin auſſi-bien que de mouſſe, et garni de plumes. Il contient depuis cinq juſqu'à ſept œufs, d'un blanc rougeâtre ſombre, marqués irrégulièrement de taches rougeâtres, et d'une forme à peu près ronde, ainſi qu'on peut le voir Pl. XXV. Fig. 1.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. XIII. STONE CHAT.

Pl. 110.

Motacilla rubicola. *Lin. Syſt.* I. p. 332.
Le Traquet. *Brif. Orn.* III. p. 428.

The length of this bird is four inches and three quarters. The bill is black: the head, neck, and throat, are alſo black; but on each ſide of the neck is a croſs bar of white appearing at a diſtance like a collar: the feathers on the back are black, with tawny edges: the rump is white: the vent whitiſh: the breaſt of a reddiſh yellow: the belly of the ſame colour, but much paler: the end and outer web of each of the extreme feathers of the tail are of a light ruſt colour, all the others are black: on the wing is a ſpot of white: the legs are black.

The female is not unlike the male in the general colouring, but is much paler; the white on the rump is wanting; and the head is not black, but of the colour of the reſt of the upper parts.

This is a reſtleſs noiſy bird, and perches frequently on ſome buſh, chattering inceſſantly. It frequents our heaths, and remains with us the whole year. It makes its neſt in a low buſh, and ſometimes under the ſhelter of a ſtone. The eggs are five or ſix in number: for which ſee Pl. XXV. Fig. 2.

STONE CHAT. I.W.Lewin del. et sculp.t Published as the Act directs Nov.r 1.1793.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. XIII. LE TRAQUET.

Pl. 110.

Motacilla rubicola. *Lin. Syſt.* I. p. 332.
Le Traquet. *Brif. Orn.* III. p. 428.

La longueur de cet oiſeau eſt de quatre pouces trois quarts. Le bec eſt noir: la tête, le col et la gorge ſont de la même couleur; mais de chaque côté du col il y a une bande blanche qui traverſe, et qui vue à une certaine diſtance reſſemble à un collier: les plumes ſur le dos ſont noires et bordées de couleur tannée: le croupion eſt blanc; le deſſous de la queue blanchâtre; la poitrine d'un jaune rougeâtre; le ventre de la même couleur, mais beaucoup plus pâle: le bout et les barbes extérieures de chacune des dernières plumes de la queue ſont couleur de rouille claire, toutes les autres ſont noires: on remarque ſur l'aile une tache blanche: les jambes ſont noires.

La femelle reſſemble aſſez au mâle pour la couleur en général, à cela près qu'elle eſt plus pâle; il n'y a point de blanc ſur le croupion; et la tête n'eſt pas noire, mais de la couleur du reſte du plumage ſupérieur.

Cet oiſeau eſt toujours en mouvement et bruyant; il perche ſouvent ſur le même buiſſon, gazouillant ſans ceſſe. Il fréquente nos bruyères, et reſte toute l'année avec nous. Il place ſon nid dans un petit buiſſon, et quelquefois ſous le couvert d'une pierre. Les œufs ſont au nombre de cinq ou ſix; on les voit repréſentés Pl. XXV. Fig. 2.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. XIV. WHIN CHAT.

Pl. 111.

Motacilla Rubetra. *Lin. Syſt.* I. p. 332.
Le grand Traquet, ou le Tarier. *Brif. Orn.* III. p. 432.

This ſpecies exceeds the laſt a trifle in ſize. The bill is black: the eyes hazel: the head and back are of a pale reddiſh brown, ſpotted with black: over the eye is a ſtreak of white: the cheeks are duſky or blackiſh: the chin white: the breaſt of a reddiſh yellow: the belly paler: the quill feathers dark brown, edged with a yellowiſh brown: on the wing a ſpot of white: the upper part of the tail black, except the two outermoſt feathers, which are edged with white: the legs black.

The female is paler in colour, and the markings every where leſs diſtinct, otherwiſe it differs little from the male.

This ſpecies likewiſe remains with us the whole year, but retires to the more ſheltered parts in winter. It frequents heaths like the ſtone chat, and builds much in the ſame manner.

For the egg ſee Pl. XXV. Fig. 3.

WHIN CHAT. J.W.L. invin. del. et sculpt. Published as the Act directs Nov.r 7. 1798.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. XIV. LE TARIER.

Pl. 111.

Motacilla Rubetra. *Lin. Syſt.* I. p. 332.
Le grand Traquet, ou le Tarier. *Brif. Orn.* III. p. 432.

Cet oiſeau ſurpaſſe de très peu le précédent en groſſeur. Il a le bec noir; les yeux couleur de noiſette; la tête et le dos d'un brun rougeâtre pâle, avec des taches noires: un trait blanc lui paſſe ſur l'œil: les joues ſont de couleur ſombre ou noirâtres: le deſſous de la tête eſt blanc; la poitrine d'un jaune rougeâtre, et le ventre plus pâle: les grandes pennes ſont d'un brun foncé et bordées d'un brun jaunâtre: ſur l'aile il y a une tache blanche: le deſſus de la queue eſt noir, excepté les deux plumes les plus extérieures qui ſont bordées de blanc: les jambes ſont noires.

La femelle eſt d'une couleur plus pâle, et les marques ſont partout moins apparentes; à cela près elle différe peu du mâle.

Cette eſpèce reſte pareillement avec nous toute l'année, mais elle ſe retire durant l'hiver dans des expoſitions plus abritées: elle fréquente les bruyères ainſi que le traquet, et conſtruit ſon nid à peu près de la même manière.

Voyez l'œuf, Pl. XXV. Fig. 3.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. XV. WHEAT-EAR.

Pl. 112.

Motacilla œnanthe. *Lin. Syſt.* I. p. 332.
Le Cul blanc, Vitrec, ou Moteux. *Briſ. Orn.* III. p. 449.

This bird is about five inches and half in length: the bill black: eyes hazel: the top of the head, back of the neck, and back, of a bluiſh grey: over the eye is a dirty white ſtreak: through the eye a black one, ending in a patch behind it: the under parts of the body yellowiſh white, changing to reddiſh on the breaſt, and to a pure white at the vent: the tail feathers white, tipped with black, except the two middlemoſt, which are all black: the feathers of the wings and quills a duſky black, edged with reddiſh brown: the legs black.

The female reſembles the male, except in being paler, having the ſtreak over the eye leſs diſtinct, and the mark behind the eye brown inſtead of black.

The wheat-ear for the moſt part comes in March, and departs in October, but is not regularly diſperſed, being in ſome parts ſcarcely known, in others extremely plenty. About Eaſtbourn, in Suſſex, great numbers are annually taken. In autumn it grows very fat, and is eſteemed a great delicacy. It generally makes a neſt on the ground, under ſhelter of a clod, ſtone, or the like, and compoſed of dry graſs or moſs, mixed with wool, and lined with hair and feathers. It lays from five to eight eggs, of a light blue colour, deepeſt towards the large end, as repreſented in Pl. XXV. Fig. 4.

WHEAT-EAR. IWLewin del. et sculp. Published as the Act directs Nov.r 7. 1795.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. XV. LE MOTTEUX.

Pl. 112.

Motacilla œnanthe. *Lin. Syſt.* I. p. 332.
Le Cul blanc, Vitrec, ou Moteux. *Briſ. Orn.* III. p. 449.

Le motteux eſt long d'environ cinq pouces et demi : il a le bec noir; les yeux noiſette; le ſommet de la tête, le derrière du col et le dos d'un gris bleuâtre : un trait d'un blanc ſale paſſe ſur l'œil; un autre qui eſt noir lui traverſe auſſi les yeux et va par de-là ſe terminer en une plaque : le deſſous du corps eſt d'un blanc jaunâtre qui ſe fond en rougeâtre ſur la poitrine, et en blanc pur ſous la queue : les plumes de la queue ſont blanches, et terminées de noir, excepté les deux intermédiaires, qui ſont entièrement noires : les plumes des ailes ainſi que les pennes ſont d'un noir mat, et bordées d'un brun rougeâtre : les jambes ſont noires.

La femelle reſſemble au mâle, ſeulement elle eſt plus pâle, le trait ſur l'œil eſt moins diſtinct, et la marque derrière l'œil eſt brune au lieu d'etre noire.

Cet oiſeau arrive communément au mois de Mars et part en Octobre : mais il n'eſt pas également répandu dans le royaume; à peine eſt il connu dans certaines parties, et dans d'autres il eſt très multiplié. Aux environs d'Eaſtbourn, dans le comté de Suſſex, on en prend tous les ans une grande quantité. En automne il devient très gras et on regarde ſa chair comme très délicate. Il fait généralement ſon nid par terre, ſous le couvert d'une motte de terre, d'une pierre, ou d'une petite éminence, le compoſe d'herbe sèche ou de mouſſe mêlée avec de la laine, et le garnit de poils et de plumes. La femelle y pond depuis cinq juſqu'à huit œufs d'un bleu clair, plus foncé vers le gros bout, comme on le voit repréſenté Pl. XXV. Fig. 4.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. XVI. REED WREN.

Pl. 113.

This bird is about the ſize of the larger pettichaps, and meaſures ſeven inches and a half in length. The bill is of a dark horn colour, broader at the baſe than in the ſedge warbler, which it moſt reſembles: the eyes olive brown: the eyelaſhes dirty white: the general colour of the plumage on the upper parts is a greeniſh olive-brown: the lower part of the body tawny white: the legs are of a light olive: the ſoles of the feet of a bright greeniſh yellow.

The female reſembles the male in every thing except being ſmaller.

The eggs are uſually about four in number, of a dirty white, ſtained all over with dull olive ſpots, chiefly at the larger end. The neſt is compoſed of dry ſtalks of graſs, ſuſpended between three or four ſtalks of reed for the moſt part, but now and then on ſome contiguous branch of a tree. For the egg ſee Pl. XXVI. Fig. 1.

RED WREN

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. XVI. LE ROITELET DES ROSEAUX.

Pl. 113.

Cet oiſeau eſt à peu près de la groſſeur de la fauvette, et a ſept pouces et demi de longueur. Son bec eſt couleur de corne foncée, et plus gros à la baſe que ne l'eſt celui de la fauvette babillarde, à laquelle il reſſemble beaucoup: il a les yeux d'un brun olive, et les cils d'un blanc ſale: la couleur générale du plumage ſupérieur eſt un brun olive verdâtre: le deſſous du corps eſt d'un blanc tanné: les jambes ſont d'un olive clair: la plante des pieds eſt d'un jaune verdâtre luiſant.

La femelle reſſemble en tout au mâle; ſeulement elle eſt plus petite.

Les œufs ſont ordinairement au nombre de quatre, d'un blanc ſale, ſemés de beaucoup de taches d'un olive terne, plus nombreuſes au gros bout. Le nid eſt compoſé de brins d'herbe sèche, ſuſpendu pour l'ordinaire entre trois ou quatre tiges de roſeau, et quelquefois placé ſur la branche d'un arbre voiſin. Voyez l'œuf, Pl. XXVI. Fig. 1.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. XVII. YELLOW WREN.

Pl. 114.

Motacilla trochilus. *Lin. Syſt.* I. p. 338.
Le Pouillot, ou Chantre. *Brif. Orn.* III. p. 479.

This ſpecies is very little bigger than the common wren, but meaſures four inches and three quarters in length. The colour of the upper part of the body is a duſky green: the feathers of the tail and wings brown, edged with yellowiſh green: over each eye is a pale yellow ſtreak: the under parts of the body are different in different birds, being in ſome of a bright yellow, which in others fades almoſt into white: the legs are yellowiſh.

The female is paler, and inclines much to white at the vent: though indeed both male and female vary ſo much at different periods of life in reſpect to colour, that authors have made of this bird different ſpecies.

This bird frequents large moiſt woods, and places where willows abound: has a low plaintive note, and is perpetually creeping up and down the bodies and branches of trees. It builds in hollows in the ſides of ditches, making its neſt in the form of an egg, with a large hole at the top as an entrance. The outſide is compoſed of moſs and hay, the inſide lined with ſoft feathers. It uſually lays ſeven eggs, for which ſee Pl. XXVI. Fig. 2.

YELLOW-WREN. J.W. Lewin del. et sculp. Published as the Act directs Nov.r 1.1795.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. XVII. LE POUILLOT.

Pl. 114.

Motacilla trochilus. *Lin. Syſt.* I. p. 338.
Le Pouillot ou Chantre. *Brif. Orn.* III. p. 479.

Cette eſpèce eſt de très peu plus groſſe que le troglodyte, mais elle a quatre pouces trois quarts de longueur. La couleur du plumage ſupérieur eſt d'un verd ſombre: les plumes de la queue et des ailes ſont brunes et bordées d'un verd jaunâtre: un trait d'un jaune pâle paſſe ſur chaque œil: le deſſous du corps eſt différent dans divers individus; il eſt dans quelques-uns d'un jaune brillant, et dans d'autres d'une couleur plus foible qui devient preſque blanche: les jambes ſont jaunâtres.

La femelle eſt plus pâle et tire beaucoup au blanc ſous la queue: il faut avouer que le mâle auſſi-bien que la femelle varient tellement dans les diverſes périodes de leur vie, quant à la couleur, que les auteurs ont fait de cet oiſeau des eſpèces différentes.

Cet oiſeau fréquente les bois humides et étendus, et ſe plaît dans les endroits où il croît beaucoup de ſaules. Il a une voix baſſe et plaintive, et ne ceſſe de grimper et de deſcendre le long des troncs et des branches d'arbres. Il bâtit ſon nid dans un creux, le long des foſſés, et lui donne la forme d'un œuf, laiſſant en haut un grand trou qui lui ſert d'entrée. Le dehors eſt compoſé de mouſſe et d'herbe sèche, et le dedans eſt tapiſſé de plumes molles et délicates. La femelle y dépoſe communément ſept œufs. Voyez Pl. XXVI. Fig. 2.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. XVIII. COMMON WREN.

Pl. 115.

Motacilla troglodytes. *Lin. Syſt.* I. p. 337.
Le Roitelet. *Briſ. Orn.* III. p. 425.

This is a ſmall bird, rarely exceeding three inches and three quarters in length. The bill and legs are duſky brown: eyes hazel: the plumage above chiefly of a reddiſh brown, croſſed every where with obſcure duſky lines: the cheeks marked with dirty white, mixed with ruſt colour: over the eye is a pale reddiſh white ſtreak: the under parts, as far as the breaſt, nearly of the ſame colour, but afterwards incline to brown croſſed with duſky lines, and daſhed with dirty white.

This bird, though ſmall, has a pleaſing ſong, much louder than could be expected from its ſize, and ſings all the year. It makes a very curious neſt, in ſhape almoſt oval, chiefly compoſed of moſs, and lined with hair and feathers. It builds moſt frequently in hollows of decayed trees, often in out-houſes, and ſometimes in woods, in a buſh near the ground; and lays from ten to eighteen eggs: for which ſee Pl. XXVI. Fig. 3.

COMMON-WREN. — I. W. Lewin, del. et sculp.t Publish'd at the Act directs, Nov.r 7, 1793.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. XVIII. LE TROGLODYTE.

Pl. 115.

Motacilla troglodytes. *Lin. Syſt.* I. p. 337.
Le Roitelet. *Briſ. Orn.* III. p. 425.

Cet oiſeau eſt fort petit, ayant rarement plus de trois pouces neuf lignes de longueur. Il a le bec et les jambes d'un brun ſombre; les yeux noiſette: ſon plumage ſupérieur eſt en grande partie d'un brun rougeâtre et coupé tranſverſalement par des lignes ſombres et foncées: les joues ſont marquées d'un blanc ſale mêlé de couleur ferrugineuſe: un trait blanc rougeâtre pâle lui paſſe ſur l'œil: la même couleur, à peu de choſe près, règne ſur le deſſous du corps juſqu'à la poitrine; mais enſuite elle tire vers le brun, traverſé de lignes ſombres, et tiqueté de blanc ſale.

Quoique petit, cet oiſeau a un ramage gracieux; ſa voix eſt beaucoup plus élevée qu'on ne l'auroit cru, à en juger par ſa taille, et il chante toute l'année. Il fait un nid très curieux, de forme à peu près ovale, compoſé principalement de mouſſe, et tapiſſé de poil et de plumes. Il le place fréquemment dans le creux des arbres, ſouvent ſous des appentis, et quelquefois dans les bois ſur un buiſſon près de terre, et y dépoſe depuis dix juſqu'à dix-huit œufs. Voyez Pl. XXVI. Fig. 3.

ORD. III. GEN. XI. WARBLER.

SPE. XIX. GOLDEN-CRESTED WREN.

Pl. 116.

Motacilla regulus. *Lin. Syſt.* I. p. 338.
Le Poul, ou Souci, ou Roitelet huppé. *Briſ. Orn.* III. p. 579.

This bird is ſtill ſmaller than the common wren, being in length only three inches and half, and weighing not more than ſeventy-ſix grains. The bill is duſky: the eyes hazel: the feathers of the forehead green: along the middle of the crown is a fine ſcarlet line, bounded on each ſide by a line of fine yellow, and this again ſkirted with black: the back and hind part of the neck yellowiſh green: the wing coverts duſky, edged with green, and tipped with white: quill and tail feathers duſky, edged with pale green, and ſome of the inner feathers have blackiſh edges: the legs are yellowiſh: the claws very long.

The female is paler in colour than the male, and the crown of the head wants the ſcarlet.

For the egg, ſee Pl. XXVI. Fig. 4.

GOLDEN-CRESTED WREN. I.W. Lewin. del. et sculp. Published as the Act directs Nov.r 1.1793.

ORD. III. GEN. XI. CHANTEUR.

ESP. XIX. LE ROITELET.

Pl. 116.

Motacilla regulus. *Lin. Syſt.* I. p. 338.
Le Poul, ou Souci, ou Roitelet huppé. *Briſ. Orn.* III. p. 579.

Cet oiſeau eſt encore plus petit que le troglodyte, n'ayant que trois pouces et demi de longueur, et ne peſant pas plus de ſoixante-ſeize grains. Le bec eſt de couleur ſombre: les yeux ſont couleur de noiſette: les plumes du devant de la tête ſont vertes; ſur le milieu du ſommet eſt une ligne longitudinale d'un bel écarlate, terminée de chaque côté par une ligne d'un beau jaune, qui elle-même eſt bordée de noir: le dos et le derrière du col ſont d'un verd jaunâtre: les couvertures des ailes ſont de couleur ſombre, bordées de verd, et terminées de blanc; les pennes de l'aile et les plumes de la queue ſont auſſi de couleur ſombre, bordées de verd pâle, et pluſieurs de celles de deſſous ſont noirâtres ſur les bords: les jambes ſont jaunâtres et les ongles très longs.

La femelle eſt d'une couleur plus pâle que le mâle, et elle n'a pas d'écarlate ſur le haut de la tête.

Voyez l'œuf, Pl. XXVI. Fig. 4.

ORD. III. GEN. XII. TITMOUSE.

Bill, ſtraight, a little compreſſed, ſtrong, hard, and ſharp pointed.
Nostrils, round, and covered with briſtles reflected over them.
Tongue, as if cut off at the end, and terminated by three or four briſtles.
Toes, divided to their origin: the hind toe very large and ſtrong.

SPECIES I. CRESTED TITMOUSE.

Pl. 117.

Parus Criſtatus. *Lin. Syſt.* I. p. 340.
Le Méſange huppée. *Briſ. Orn.* III. p. 558.

This bird is in length near five inches, and weighs one third of an ounce. The bill is blackiſh: the feathers on the crown of the head black, edged with white, the hinder ones forming a beautiful pointed creſt: at the hinder part of the head is a black line, encompaſſing the neck, and terminating in the throat, which alſo is black: the ſide of the neck and head above this black line is white, with an irregular ſpot of black behind the ears: the breaſt and belly white, with a reddiſh tinge at the ſides: the upper parts of the body duſky: the quill and tail feathers ſomewhat darker, with edges of a lighter hue: the legs lead colour.

The creſted titmouſe is not a common Britiſh bird, but it has been killed in Scotland, and alſo in Yorkſhire.

CRESTED TIT. J.W.Lewin. del.et.sculp.t Publish'd as the Act directs Nov.r 7.1795.

ORD. III. GEN. XII. MÉSANGE.

Le bec, droit, un peu comprimé, fort, dur et très pointu.
Les narines, l'ouverture ronde, et couvertes de ſoies recourbées en dedans.
La langue, comme tronquée, et terminée par trois ou quatre filets.
Les doigts, diviſés à leur origine : le doigt poſtérieur étant très large et fort.

ESPÈCE I. LA MÉSANGE HUPPÉE.

Pl. 117.

Parus Criſtatus. *Lin. Syſt.* I. p. 340.
La Méſange huppée. *Briſ. Orn.* III. p. 558.

Cette méſange eſt longue d'environ cinq pouces, et pèſe le tiers d'une once. Le bec eſt noirâtre : les plumes du ſommet de la tête ſont noires et bordées de blanc, les poſtérieures formant une ſuperbe huppe pointue ; ſur le derrière de la tête eſt une ligne noire, qui entoure le col, et qui vient ſe terminer ſur la gorge qui eſt pareillement noire : le côté du col et de la tête au-deſſus de cette ligne noire eſt de couleur blanche, avec une tache irrégulière de noir derrière les oreilles : la poitrine et le ventre ſont blancs, avec une teinte rougeâtre ſur les côtés : le deſſus du corps eſt de couleur ſombre : les pennes de l'aile et les plumes de la queue ſont un peu plus foncées, et bordées d'une couleur plus claire : les jambes ſont plombées.

La méſange huppée n'eſt pas commune en Angleterre : cependant cet oiſeau a été tué en Ecoſſe et dans le comté d'York.

ORD. III. GEN. XII. TITMOUSE.

SPE. II. GREAT TITMOUSE.

Pl. 118.

Parus major. *Lin. Syſt.* I. p. 341.
Le Groſſe Méſange, ou la Charbonniere. *Brif. Orn.* III. p. 539.

This bird is five inches and three quarters in length, and weighs nearly an ounce. The bill is black: eyes hazel: the head and throat black: the cheeks white: neck, ſhoulders, and middle of the back of a yellowiſh green: the rump blue: the breaſt, belly, and thighs yellow, with a broad black line in the middle running from the throat to the vent: vent white: the quill feathers duſky, edged partly with blue, partly with white; the edges of the three next the body green: wing coverts blue; the greater tipped with white, ſo as to form a tranſverſe line of that colour: the exterior vanes of the tail feathers, except the outmoſt, blue or aſh coloured, the interiour vanes black; the outmoſt have their exteriour vanes and tips white: the legs lead-coloured.

This ſpecies builds in hollow trees, laying from eight to twelve white eggs, ſpotted with bright red, moſtly ſo at the larger end. Its fleſh is not good to eat, being bitter. To what varieties this bird may be ſubject we cannot ſay, but a curious one is delineated in the frontiſpiece of the firſt volume of this work, which is worthy notice for its ſingularity.

For the egg, ſee Pl. XXVII. Fig. 1.

GREAT · TIT. J.W. Lewin del. et sculp.t Publish'd as the Act directs. Nov.r 7, 1793.

ORD. III. GEN. XII. MÉSANGE.

ESP. II. LA GROSSE MÉSANGE.

Pl. 118.

Parus major. *Lin. Syſt.* I. p. 341.
La groſſe Méſange, ou la Charbonnière. *Briſ. Orn.* III. p. 539.

Cet oiſeau a cinq pouces neuf lignes de longueur, et pèſe près d'une once. Le bec eſt noir: les yeux ſont couleur de noiſette: la tête et la gorge ſont noires; les joues blanches: le col, la baſe des ailes et le milieu du dos ſont d'un verd jaunâtre: le croupion eſt bleu: la poitrine, le ventre et les cuiſſes ſont jaunes, avec une large raie noire au milieu, qui s'étend depuis la gorge juſqu'à l'anus: le deſſous de la queue eſt blanc: les grandes plumes des ailes ſont de couleur ſombre, et bordées en partie de bleu et en partie de blanc; les bords des trois près du corps étant vertes: les couvertures des ailes ſont bleues, les plus grandes terminées de blanc; ce qui forme une ligne tranſverſale de cette couleur: les barbes extérieures des plumes de la queue, excepté les plus extérieures, ſont bleues ou cendrées; les barbes intérieures ſont noires; les plumes les plus extérieures ont leurs barbes et leurs bouts de couleur blanche: les jambes ſont plombées.

Cette méſange fait ſon nid dans le creux des arbres, où l'on trouve depuis huit juſqu'à douze œufs blancs, ſemés de taches de rouge clair, plus communes au gros bout. La chair n'eſt pas un bon manger: elle eſt très amère. Nous ne pouvons aſſigner toutes les variétés de cette eſpèce; mais le frontiſpice du premier volume de cet ouvrage nous en offre une digne d'être remarquée à raiſon de ſa ſingularité.

Voyez l'œuf Pl. XXVII. Fig. 1.

ORD. III. GEN. XII. TITMOUSE.

SPE III. COLE TITMOUSE.

Pl. 119.

Parus ater. *Lin. Syſt.* I. p. 341.
La Méſange à tête noir. *Briſ. Orn.* III. p. 551.

This ſpecies is four inches in length, and weighs two drams. The bill is black; the head and throat are black: on the hind part of the head is a white ſpot, and a broad band of white paſſes juſt under the eye to the ſides of the neck: the back is of a greeniſh grey; the rump more green: the tail and wings duſky, the exteriour feathers edged with green: the leſs wing coverts greeniſh grey, the greater duſky, and both tipped with white, forming two bands of that colour: the under parts of the body are white, with a ruſty tinge: the legs lead colour. The tail is ſlightly forked.

This bird is pretty common in our woods, where it makes its neſt in the holes of trees.

For the egg, ſee Pl. XXVII. Fig. 2.

Vol. E - Pl.ᵉ I. W. Lewin del. et sculp.ᵗ Publish'd in the Act directs Nov.ʳ 7. 1798

ORD. III. GEN. XII. MÉSANGE.

ESP. III. LA MÉSANGE À TÊTE NOIRE.

Pl. 119.

Parus ater. *Lin. Syſt.* I. p. 341.
La Méſange à tête noire. *Brif. Orn.* III. p. 551.

Cette eſpèce a quatre pouces de longueur et pèſe deux drachmes. Le bec eſt noir ainſi que la tête et la gorge: derrière la tête il y a une tache blanche; une large bande de la même couleur paſſe exactement au deſſous de l'œil, et vient ſe terminer aux deux côtés du col: le dos eſt d'un gris verdâtre et le croupion plus verd: la queue et les ailes ſont de couleur ſombre, et les plumes extérieures bordées de verd: les petites couvertures des ailes ſont d'un gris verdâtre, les grandes de couleur ſombre; et les unes et les autres, blanches par le bout, forment deux bandes de cette dernière couleur: le deſſous du corps eſt blanc, avec une teinte de rouille: les jambes ſont couleur de plomb: la queue eſt tant ſoit peu fourchue.

Cet oiſeau eſt aſſez commun dans nos bois où il fait ſon nid dans des trous d'arbre.

Voyez l'œuf, Pl. XXVII. Fig. 2.

ORD. III. GEN. XII. TITMOUSE.

SPE. IV. MARSH TITMOUSE.

Pl. 120.

Parus paluſtris. *Lin. Syſt.* I. p. 341.
La Méſange de Marais, ou la Nonette cendrée. *Brif. Orn.* III. p. 555.

This bird is about the ſize of the preceding ſpecies, or, if any thing, bigger. It is not unlike it in the general colour of the plumage; but it wants the white ſpot on the head, the whole crown of which is black, and the black ſpot under the throat is ſmaller: the colour of the upper parts of the body is alſo lighter, and has leſs appearance of green. In ſome birds the wing coverts are croſſed with white, in others not.

The neſt is made in old trees, and chiefly in woods. The egg is of a rounder ſhape than that of any other of the genus. See Pl. XXVII. Fig. 3.

MARSH TIT. Jw. Lewin, del. et sculp.t Published as the Act directs, Nov.r 7, 1793.

ORD. III. GEN. XII. MÉSANGE.

ESP. IV. LA MÉSANGE DE MARAIS.

Pl. 120.

Parus paluſtris. *Lin. Syſt.* I. p. 341.
La Méſange de Marais ou la Nonette cendrée. *Briſ. Orn.* III. p. 555.

Cet oiſeau eſt à peu près de la taille de l'eſpèce précédente, ou bien peut-être, un peu plus gros. Il lui reſſemble aſſez pour la couleur générale du plumage; mais il n'a pas la tache blanche ſur la tête, dont tout le ſommet eſt noir, et la tache noire ſur la gorge eſt plus petite: la couleur du deſſus du corps eſt auſſi plus claire, et ſemble offrir moins de verd. Dans quelques individus les couvertures des ailes ſont coupées par des raies blanches, tandis que dans d'autres elles ne le ſont pas.

Le nid ſe trouve dans de vieux arbres, et ſurtout dans les bois. L'œuf eſt d'une forme plus ronde que ne l'eſt celui des autres eſpèces de ce genre. Voyez Pl. XXVII. Fig. 3.

ORD. III. GEN. XII. TITMOUSE.

SPE. V. BLUE TITMOUSE.

Pl. 121.

Parus cæruleus. *Lin. Syſt.* I. p. 341.
La Méſange bleue. *Briſ. Orn.* III. p. 544.

This ſpecies is ſomewhat larger than the preceding. The bill is ſhort and blackiſh: the crown of the head blue: the forehead and ſide of the head white, the latter bounded underneath by a black line: a black line alſo paſſes from the bill through the eye: the back is of a yellowiſh green: the under parts of the body yellow: the wings and tail blue; the former marked tranſverſely with a white bar: the legs lead colour.

This bird is very common, and frequently ſeen in our orchards and gardens, buſily employed in picking off the buds from the trees in ſearch of inſects. It makes its neſt in the holes of walls or trees, lining it with feathers, and laying a number of white eggs faintly ſpotted with red, ſometimes as far as twelve. See Pl. XXVII. Fig. 4.

BLUE-TIT. W.Lewin del. & sculp. Published as the Act directs, Nov.r 1.1795.

ORD. III. GEN. XII. MÉSANGE.

ESP. V. LA MÉSANGE BLEUE.

Pl. 121.

Parus cæruleus. *Lin. Syſt.* I. p. 341.
La Méſange bleue. *Brif. Orn.* III. p. 544.

Cette eſpèce ſurpaſſe un peu la précédente en groſſeur. Elle a le bec court et noirâtre; le ſinciput bleu; le front blanc, ainſi que le côté de la tête, qui par en-bas eſt bordé d'une ligne noire: une ligne de la même couleur part du bec et lui paſſe ſur l'œil: le bec eſt d'un verd jaunâtre: le deſſous du corps eſt jaune: la queue eſt bleue auſſi-bien que les ailes, qui ſont marquées tranſverſalement d'une bande blanche: les jambes ſont plombées.

Cet oiſeau eſt très commun; on le voit fréquemment dans nos vergers et dans nos jardins, occupé à becqueter les boutons des arbres pour trouver des inſectes. Il fait ſon nid dans des trous de mur ou d'arbre, le garnit de plumes, et y dépoſe des œufs blancs, tachetés de rouge, quelquefois juſqu'au nombre de douze. Voyez Pl. XXVII. Fig. 4.

ORD. III. GEN. XII. TITMOUSE.

SPE. VI. LONG-TAILED TITMOUSE.

Pl. 122.

Parus caudatus. *Lin. Syſt.* I. p. 342.
La Méſange à longue queue. *Briſ. Orn.* III. p. 570.

This elegant ſpecies is nearly five inches and half in length. The bill is black, very ſhort, thick, and convex, differing greatly from all others of the titmouſe genus; the baſe of it is beſet with ſmall briſtles: the eyes are hazel: the top of the head is white, mixed with a few dark grey feathers, and ſurrounded by a broad ſtreak of black, like a crown, from the middle of which a ſimilar ſtreak is continued down the neck and back as far as the rump: the feathers on each ſide of this black ſtreak are of a purpliſh red: the leſs wing coverts are black; the greater brown, edged with roſe colour, and tipped with white: the quills duſky, the ſmaller ones having their exteriour ſides edged with white: the cheeks and throat are white: the breaſt and belly white, with a caſt of red. The tail is longer in proportion to its bulk than that of any other Britiſh bird, being in length three inches: it reſembles in ſhape that of a magpie, conſiſting of twelve feathers of unequal lengths, the outer ones being much the ſhorteſt: the exteriour ſides and top of the interiour ſides of the three outmoſt are white, the reſt of the tail black.

This bird makes a very curious neſt of moſs, liverwort, and wool, warmly lined with a thick bed of feathers. It is of an oval ſhape, with a ſmall hole for entrance, and often contains twenty eggs, for which ſee Pl. XXVII. Fig. 5.

LONG TAIL TIT. I. W. Lewin, del. et sculp. Published as the Act directs Nov. 1, 1795

ORD. III. GEN. XII. MÉSANGE.

ESP. VI. LA MÉSANGE À LONGUE QUEUE.

Pl. 122.

Parus caudatus. *Lin. Syſt.* I. p. 342.
La Méſange à longue queue. *Brif. Orn.* III. p. 570.

Cette élégante eſpèce a environ cinq pouces et demi de longueur. Le bec eſt noir, très court, épais et convexe; différant beaucoup de toutes les autres eſpèces du genre méſange; ſa baſe eſt entourée d'eſpèces de petites ſoies: les yeux ſont couleur de noiſette: le ſommet de la tête eſt blanc, avec quelques plumes d'un gris foncé, et entouré d'une bande noire qui lui forme une eſpèce de couronne, du milieu de laquelle part un trait de la même couleur qui deſcend le long du col, et ſe prolonge ſur le dos juſqu'au croupion: les plumes de chaque côté de ce trait noir ſont d'un rouge pourpré: les petites couvertures des ailes ſont noires; les grandes brunes, bordées de couleur de roſe, et terminées de blanc: les grandes plumes des ailes ſont de couleur ſombre, les petites ayant leurs côtés extérieurs bordés de blanc: les joues et la gorge ſont blanches; la poitrine et le ventre blancs lavés de rouge: la queue par rapport aux dimenſions du corps, eſt plus longue que dans tous les autres oiſeaux de ce pays, ayant trois pouces de longueur; elle reſſemble pour la forme à celle de la pie, conſiſtant en douze plumes de grandeur inégale, les extérieures étant beaucoup plus courtes; les côtés extérieurs et le haut des côtés intérieurs des trois plumes qui ſont les plus extérieures ſont blancs, le reſte de la queue eſt noir.

Cet oiſeau fait un nid très curieux de mouſſe, de lichen et de laine; et le garnit d'un bon lit de plumes bien chaud. Il lui donne une forme ovale, ne laiſſe pour entrée qu'un petit trou, et pond ſouvent juſqu'à vingt œufs. Voyez Pl. XXVII. Fig. 5.

ORD. III. GEN. XII. TITMOUSE.

SPE. VII. BEARDED TITMOUSE.

Pl. 123.

Parus biarmicus. *Lin. Syſt.* I. p. 342.
Le Méſange barbue, ou le Mouſtache. *Briſ. Orn.* III. p. 567.

This is larger than the foregoing ſpecies, and is ſix inches and a quarter in length. The bill in the male is orange-colour: the eyes hazel: the head grey: beneath the eye is a tuft of black feathers ending in a point like a whiſker: the upper parts of the body of an orange bay, or yellow ruſt-colour: the chin and throat white: breaſt fleſh colour: the belly, ſides, and thighs, much the ſame as the upper parts, but paler: the vent black: the quill feathers duſky with pale edges; the ſecondaries black edged with orange: the tail is cuneiform, two inches and three quarters long, and in colour like the back, but ſomewhat deeper: the legs are black.

In the female the black mark on the cheek and the fine fleſh colour on the breaſt are wanting: the crown of the head is of a browniſh ruſt colour, ſpotted with black: the vent of the ſame colour with the belly: and the outmoſt feathers of the tail are black tipped with white.

This ſpecies, I believe, is found only in watery places where reeds grow; among which it makes its neſt, and breeds. It is a conſtant inhabitant of this kingdom, and may be met with in the above ſituations at all ſeaſons.

BEARDED TIT. J.W.Lewin del. et sculp.t Published as the Act directs Nov.r 1.st 1795

ORD. III. GEN. XII. MÉSANGE.

ESP. VII. LA MÉSANGE BARBUE.

Pl. 123.

Parus biarmicus. *Lin. Syſt.* I. p. 342.
La Méſange barbue ou le Mouſtache. *Brif. Orn.* III. p. 567.

Cette Méſange eſt la plus groſſe de toutes: elle a ſix pouces et un quart de longueur. Le bec du mâle eſt orangé: les yeux ſont couleur de noiſette: la tête eſt griſe: au deſſous de l'œil eſt une touffe de plumes noires qui ſe terminent en pointe en forme de mouſtache: le plumage ſupérieur eſt d'un bai orangé, ou d'un jaune ferrugineux: le deſſous de la tête et la gorge ſont blancs: la poitrine eſt couleur de chair: le ventre, les côtés et les cuiſſes reſſemblent beaucoup à la partie ſupérieure du corps, à cela près qu'ils ſont plus pâles: le deſſous de la queue eſt noir: les grandes pennes de l'aile de couleur ſombre ſont bordées de couleur pâle; les ſecondaires ſont noires avec des bords orangés: la queue, qui a la forme d'un coin, eſt longue de deux pouces neuf lignes, et ne différe du dos pour la couleur, qu'en ce qu'elle eſt un peu plus foncée. Les jambes ſont noires.

Dans la femelle on ne trouve ni la marque noire ſur les joues, ni la belle couleur de chair ſur la poitrine: le ſommet de la tête eſt d'un ferrugineux brunâtre, tacheté de noir: le deſſous de la queue eſt de la couleur du ventre; et les plumes les plus extérieures de la queue ſont noires et terminées de blanc.

Cette eſpèce, je penſe, ſe trouve ſeulement dans les lieux marécageux où il croît des roſeaux, au milieu deſquels elle fait ſon nid et multiplie. Elle ne quitte point ce royaume, et on la rencontre en ces mêmes lieux dans toutes les ſaiſons de l'année.

ORD. III. GEN. XIII. SWALLOW.

Bill, ſhort, broad at the baſe, ſmall at the point, and a little bending.
Nostrils, open.
Tongue, ſhort, broad, and cloven.
Legs, ſhort.
Tail, forked.
Wings, long.

SPECIES I. CHIMNEY SWALLOW.

Pl. 124.

Hirundo ruſtica. *Lin. Syſt.* I. p. 343.
L'Hirondelle de cheminée. *Brif. Orn.* II. p. 486.

The chimney ſwallow is rather more than ſix inches in length. The bill is black: the eyes hazel: the forehead and chin of a reddiſh chefnut: the general colour of the body black, gloſſed with a rich purpliſh blue: the breaſt and belly white: that of the male has a reddiſh tinge: the tail very forked, and every feather, except the two middle ones, marked with an oval ſpot of white on the inner web near the end: the legs blackiſh.

The female differs chiefly in having the exteriour feathers of the tail much ſhorter than the male.

This bird comes to us about the firſt or ſecond week in April, and builds its neſt in chimnies, within five or ſix feet of the top. The neſt is compoſed of mud, mixed with ſtraw and hair, and lined with feathers. The eggs are four or five in number, marked with ſmall duſky and reddiſh ſpecks; though thoſe of the reſt of the genus which frequent England are white. See the egg, Pl. XXVIII. Fig. 1.

CHUAVEY SWALLOW. [illegible]

ORD. III. GENRE XIII. HIRONDELLE.

Le bec, court, large à la baſe, étroit à la pointe, et un peu arqué.
Les narines, ouvertes.
La langue, courte, large et fendue.
Les jambes, courtes.
La queue, fourchue.
Les ailes, longues.

ESP. I. L'HIRONDELLE DE CHEMINÉE.

Pl. 124.

Hirundo ruſtica. *Lin. Syſt.* I. p. 343.
L'Hirondelle de cheminée. *Briſ. Orn.* II. p. 486.

L'hirondelle de cheminée eſt longue au moins de ſix pouces. Elle a le bec noir; les yeux couleur de noiſette; le front et le deſſous de la tête d'un marron rougeâtre: la couleur générale du corps eſt noire, luſtrée d'un beau bleu pourpre; la poitrine blanche ainſi que le ventre qui, dans le male, a une teinte rougeâtre: la queue eſt très fourchue, et chaque plume, excepté les deux du milieu, eſt marquée d'une tache blanche ovale ſur la barbe intérieure près du bout: les jambes ſont noirâtres.

La femelle différe principalement du mâle, en ce qu'elle a les plumes extérieures de la queue beaucoup plus courtes.

Cet oiſeau arrive en ce pays vers la première ou ſeconde ſemaine d'Avril. Il ſe bâtit un nid dans l'intérieur des cheminées à cinq ou ſix pieds du haut, le compoſe de terre, gâchée avec de la paille et du crin, et le garnit de plumes. Les œufs, au nombre de quatre ou cinq, ſont marqués de points ſombres et rougeâtres, quoique ceux du reſte du genre, qui fréquentent l'Angleterre, ſoient blancs. Voyez l'œuf, Pl. XXVIII. Fig. 1.

ORD. III. GEN. XIII. SWALLOW.

SPE. II. HOUSE MARTIN.

Pl. 125.

Hirundo urbica. *Lin. Syſt.* I. p. 344.
La petite Hirondelle, ou le Martinet à cul blanc. *Briſ. Orn.* II. p. 490.

This is ſmaller than the chimney ſwallow, being in length five inches and a half. The bill is black: inſide of the mouth yellow: eyes hazel: general colour of the plumage gloſſy blue black, except the rump and under parts, which are white: the tail is much leſs forked than that of the preceding ſpecies: the legs are covered with white down.

This bird appears in England about the middle of April, and is much more common than the firſt ſpecies. It builds a neſt of mud, under the eaves of buildings, or cornices of houſes, or in the upper corner of a window, with a hole in the ſide for an entrance, and lined with feathers. The eggs are from three to five in number, of a plain white colour, inclining to duſky at the larger end: ſee Pl. XXVIII. Fig. 2.

HOUSE MARTIN. I. W. Lowen del. et sculp.t Publish'd as the Act directs Nov.r 7.1791

ORD. III. GEN. XIII. HIRONDELLE.

ESP. II. L'HIRONDELLE DE FENÊTRE.

Pl. 125.

Hirundo urbica. *Lin. Syſt.* I. p. 344.
La petite Hirondelle, ou le Martinet à cul blanc. *Briſ. Orn.* II. p. 490.

Cette eſpèce eſt plus petite que l'hirondelle de cheminée, n'ayant que cinq pouces et demi de longueur. Le bec eſt noir au-dehors, jaune en dedans : les yeux ſont couleur de noiſette : la couleur générale du plumage eſt d'un noir bleu luſtré, excepté le croupion et le deſſous du corps qui ſont blancs : la queue eſt beaucoup moins fourchue que dans l'eſpèce précédente : les jambes ſont couvertes d'un duvet blanc.

Cet oiſeau paroît en Angleterre vers la mi-Avril, et eſt beaucoup plus commun que l'hirondelle de cheminée. Il ſe conſtruit un nid de boue, ſous les avant-toits des bâtimens, ou les corniches des maiſons, ou au coin ſupérieur d'une fenêtre, avec un trou ſur le côté pour y entrer, et un lit de plumes. Les œufs ſont au nombre de trois, quatre ou cinq, d'un blanc pur, qui ſe change en une couleur ſombre vers le gros bout. Voyez Pl. XXVIII. Fig. 2.

ORD. III. GEN. XIII. SWALLOW.

SPE. III. SAND MARTIN.

Pl. 126.

Hirundo riparia. *Lin. Syſt.* I. p. 344.
L'Hirondelle de rivage. *Briſ. Orn.* II. p. 506.

This is the leaſt bird of the genus that frequents this kingdom; being in length four inches and three quarters. The bill is blackiſh: the upper parts of the body are mouſe coloured: the throat, and all the under parts, white, excepting a bar of mouſe colour acroſs the upper part of the breaſt: the legs blackiſh, and ſmooth, except a few ſmall feathers behind. The tail is very ſlightly forked.

This ſpecies for the moſt part frequents the banks of rivers, and ſand pits, where it digs deep horizontal holes in the ſides, at the end of which it forms its neſt, ſimply of dried fibres, or ſtraw, mixed with a few feathers. It lays about five eggs, of a clear and tranſparent white, as in Pl. XXVIII. Fig. 3.

SAND MARTIN IWL [illegible] Published as the Act directs Nov.r 7. 1793.

ORD. III. GEN. XIII. HIRONDELLE.

ESP. III. L'HIRONDELLE DE RIVAGE.

Pl. 126.

Hirundo riparia. *Lin. Syſt.* I. p. 344.
L'Hirondelle de rivage. *Briſ. Orn.* II. p. 506.

Parmi les oiſeaux de ce genre qui fréquentent ce royaume celui-ci eſt le plus petit; puis qu'il n'a que quatre pouces trois quarts de longueur: le bec eſt noirâtre: le plumage ſupérieur eſt couleur de ſouris: la gorge et tout le deſſous du corps ſont blancs, excepté une raie couleur de ſouris qui traverſe le deſſous de la poitrine: les jambes ſont noirâtres et unies; on y voit ſeulement par derrière quelques petites plumes. La queue eſt trés peu fourchue.

Cette eſpèce fréquente en général les bords des rivières et des ſablonnières, où elle creuſe horizontalement ſur les côtés des trous profonds, à l'extrémité desquels eſt placé ſon nid, qu'elle forme tout ſimplement de fibres sèches, ou de paille, mêlées avec quelques plumes. La femelle y dépoſe environ cinq œufs, d'un blanc clair et tranſparent. Voyez Pl. XXVIII. Fig. 3.

ORD. III. GEN. XIII. SWALLOW.

SPE. IV. SWIFT.

Pl. 127.

Hirundo apus. *Lin. Syſt.* I. p. 344.
Le Martinet. *Brif. Orn.* II. p. 512.

This is the largeſt of our ſwallows, being nearly eight inches long, and eighteen inches in extent of wing, yet it weighs ſcarcely an ounce. The bill is black: the eyes hazel: the whole of its plumage a dull ſooty black, except the chin, which is white. The tail is forked, the outer feather exceeding the middle one by about an inch. It differs from the reſt of the genus in having all the toes placed forwards; the leaſt conſiſting of one bone only, the others of two each. The legs are very ſhort.

The female is rather leſs than the male, the colour of her feathers inclines more to brown, and the white on the chin is leſs diſtinct.

This bird comes late into England; ſeldom before the beginning of May. It makes a looſe neſt, chiefly by placing a few ſoft feathers, or the like, in a hole in ſome elevated place, as a ſteeple or tower, and lays not more than five eggs, of a longiſh ſhape, and white: ſee Pl. XXVIII. Fig. 4. The ſwift is more on the wing than any bird we know, performing all its functions, incubation excepted, in the air. Its flight is extremely rapid, and attended with a ſhrill ſcream.

SWIFT. — Wm Lawson del. et sculpt. Published as the Act directs, Novr 7, 1790.

ORD. III. GEN. XIII. HIRONDELLE.

ESP. IV. LE MARTINET.

Pl. 127.

Hirundo apus. *Lin. Syſt.* I. p. 344.
Le Martinet. *Briſ. Orn.* II. p. 512.

Cette eſpèce eſt la plus grande de nos hirondelles, ayant environ huit pouces de longueur, et dix-huit de vol; néanmoins elle pèſe à peine une once. Le bec eſt noir: les yeux ſont couleur de noiſette: tout le plumage eſt d'un noir de ſuie terni, excepté au-deſſous du bec où il eſt blanc. La queue eſt fourchue, la plume extérieure dépaſſant celle du milieu d'environ un pouce. Cet oiſeau différe des autres de ce genre par les doigts qu'il a tous tournés en avant; il n'y a qu'un os dans le plus petit, tandis qu'il y a deux phalanges dans chacun des autres. Les jambes ſont très courtes.

La femelle eſt tant ſoit peu plus petite que le mâle; la couleur de ſes plumes tire plus au brun, et le blanc du deſſous de la tête eſt moins pur.

Le martinet arrive tard en Angleterre, rarement avant le commencement de Mai. Il fait un nid ſans art, ſe contentant de placer quelques plumes bien mollettes, ou des matériaux de cette eſpèce, dans un trou en un lieu élevé, comme un clocher ou une tour, et n'y dépoſe que cinq œufs, de forme alongée et blancs: voyez Pl. XXVIII. Fig. 4. Le martinet eſt de tous les oiſeaux que nous connoiſſons celui qui ſe repoſe le moins, rempliſſant en l'air, à l'incubation près, toutes les vues de la nature. Son vol eſt extrêmement rapide et accompagné d'un cri aigu.

ORD. III. GEN. IV. NIGHT SWALLOW.

Bill, very ſhort, hooked at the end, and very ſlightly notched near the point.

Nostrils, tubular and a little prominent.

Mouth, very wide: on the edges of the upper part, between the bill and eyes, ſeven or more ſtiff briſtles.

Tongue, ſmall, entire at the end.

Toes, joined by a ſtrong membrane as far as the firſt joint: the claw of the middle toe broad-edged and ſerrated.

SPECIES I. NIGHT SWALLOW.

Pl. 128.

Caprimulgus Europæus. *Lin. Syſt.* I. p. 346.
Le Tette-chévre, ou Crapaud-volant. *Briſ. Orn.* II. p. 470.

This bird is in length ten inches and half, extent of wing twenty-two, and weighs two ounces and half. The plumage is beautifully variegated, the ground colour, which is nearly black, being mottled with aſh colour, dark brown, ruſt colour, and white, diſpoſed in lines, bars, and ſpots. The eyes are hazel: the legs ſhort, and feathered much below the knee.

The male differs from the female in having an oval ſpot of white on the inner web of the firſt three quills, and another at the end of the two outer tail feathers, the plumage too is in general more bright.

The night ſwallow feeds on inſects, which it takes on the wing like the ſwift, but only in the duſk of the evening, ſecreting itſelf during the whole of the day in the woods. It comes to us in the end of May, and departs in September. It makes no neſt, but lays two eggs on the bare ground, ſee the egg, Pl. XXIX. Fig. 1.

NIGHT SWALLOW. J.W. Lawson del. et sculp. Published [illegible] New York [illegible]

ORD. III. GENRE XIV. ENGOULEVENT.

Le bec, fort court, crochu par le bout, et très légérement échancré près de la pointe.

Les narines, tubulées et un peu saillantes.

La bouche, très large : sur les bords de la partie supérieure, entre le bec et les yeux, se trouvent des soies roides, au nombre de sept au moins.

La langue, petite, non divisée par le bout.

Les doigts, unis par une forte membrane jusqu'à la première phalange : les bords de l'ongle du doigt du milieu étant larges et dentelés.

ESP. I. ENGOULEVENT.

Pl. 128.

Caprimulgus Europæus. *Lin. Syst.* I. p. 346.
Le tette-chévre, ou crapaud-volant. *Brisſ. Orn.* II. p. 470.

Cet oiseau a dix pouces et demi de longueur, vingt-deux d'envergure, et pèse deux onces et demie. Son plumage est joliment varié ; sur le fond, qui est presque noir, le cendré, le brun foncé, le ferrugineux et le blanc se trouvent mêlés et distribués en lignes, raies et taches. Il a les yeux couleur de noisette, les jambes courtes et garnies de plumes bien au-dessous du talon.

Le mâle différe de la femelle par une tache blanche ovale placée sur le côté intérieur des trois premières pennes de l'aile, et par une autre qui est au bout des deux pennes les plus extérieures de la queue. Le plumage est aussi en général d'une couleur plus vive.

L'engoulevent vit d'insectes qu'il saisit en volant comme le martinet ; mais seulement le soir après le coucher du soleil, se tenant caché dans les bois durant tout le jour. Il paroît en ce pays à la fin de Mai et nous quitte en Septembre. Il ne fait pas de nid, mais il dépose ses œufs à crud sur la terre. Voyez l'œuf, Pl. XXIX. Fig. 1.

ORDER IV. COLUMBINE.

The birds of this order have a weak ſlender bill, ſtraight at the baſe, with a ſoft protuberant ſubſtance in which the noſtrils are lodged. The tongue is entire: the legs are ſhort and red: the toes divided to the origin. Their flight is ſwift and diſtant: their pace, walking. They have a peculiar plaintive note, or cooing. The male inflates or ſwells up his breaſt in courtſhip. The female lays but two eggs at a time. The male and female ſit alternately, and feed their young, ejecting the meat out of their ſtomachs into the mouths of the neſtlings. They feed on grain and ſeeds. The neſt is ſimple, and made in trees, or holes of rocks, or walls.

GENUS I. PIGEON.

As this is the only genus of the order, it is unneceſſary to repeat the characters.

SPECIES I. STOCK PIGEON.

Pl. 129.

Columba Œnas. *Lin. Syſt.* I. p. 279.
Le Pigeon ſauvage. *Briſ. Orn.* I. p. 86.

The length of this bird is fourteen inches. The bill of a pale red colour: the head aſh coloured: the hind part and ſides of the neck of a green gold colour gloſſed with copper: the forepart of the neck aſh colour: back and wings darker aſh: lower part of the back and rump the ſame, but paler: lower part of the neck and breaſt daſhed with purpliſh or red wine colour: thence to the vent pale aſh colour: the four or five outmoſt quill feathers are black, with white edges; the reſt are black at the upper part, and aſh coloured at the lower: on each wing are two black ſpots: the tail is black at the end, and has ſometimes a bar of the ſame colour acroſs the middle; its two outer feathers are white from the baſe to the middle on the outer edge. The ſexes do not differ.

This ſpecies makes its neſt of a few twigs or ſticks looſely put together, for the moſt part in the hollows of trees, and breeds commonly twice in the year. The eggs are, as in all the known ſpecies, white, and ſcarcely ever more than two in number, one of which uſually produces a male, the other a female. Another pigeon, ſimilar to this, is ſaid to frequent rocks and cliffs, differing not materially, except that the rump is white: but whether it be a diſtinct ſpecies or not I ſhall not pretend to determine. It is from one or ther of theſe, that all the varieties of dove-houſe pigeons, and ſome fancy ones, have been derived.

For the egg, ſee Pl. XXIX. Fig. 2.

STOCK PIGEON. J.W. Lewin del. et sculp.t Published as the Act directs Nov.r 7. 1793.

ORDRE IV. PIGEON.

Les oiſeaux de cet ordre ont le bec foible et délié, droit à la baſe, avec une excroiſſance de ſubſtance molle où ſont placées les narines. La langue eſt entière: les jambes ſont courtes et rouges, et les doigts diviſés à leur origine. Leur vol eſt rapide et ſoutenu : leur mouvement progreſſif eſt la marche. Ils ont un ton de voix plaintif qui leur eſt particulier, appellé roucoulement. Le mâle enfle ſon jabot quand il veut plaire à ſa femelle : chaque ponte n'eſt que de deux œufs. Le mâle et la femelle couvent alternativement, et nourriſſent leurs petits en dégorgeant dans le bec de ceux-ci l'aliment qu'ils ont préparé dans leur jabot. Ils vivent de grains et de ſemences. Le nid eſt ſimple, et placé dans les arbres, ou dans des trous de rocher ou de muraille.

GENRE I. PIGEON.

Comme il n'y a dans l'ordre que ce genre, il eſt inutile de répéter les caractères.

ESPÈCE I. PIGEON SAUVAGE.

Pl. 129.

Columba Œnas. *Lin. Syſt.* I. p. 279.
Le Pigeon ſauvage. *Briſ. Orn.* I. p. 86.

La longueur de cet oiſeau eſt de quatorze pouces. Le bec eſt d'un rouge pâle : la tête eſt cendrée : le derrière ainſi que les côtés du col ſont d'une couleur d'or verte, luſtrée de couleur de cuivre ; le devant du col eſt cendré : le dos et les ailes ſont d'un cendré plus foncé : le bas du dos et le croupion ſont de la même couleur, mais plus pâle : le bas du col et la poitrine ſont tiquetés de couleur pourprée ou vineuſe : il règne enſuite juſqu'à l'anus un cendré pâle : les quatre ou cinq grandes pennes les plus extérieures ſont noires et bordées de blanc ; le reſte eſt noir en haut et cendré en bas : il y a ſur chaque aile deux taches noires : la queue eſt noire par le bout, et quelquefois traverſée au milieu par une barre de même couleur ; ſes deux plumes extérieures ſont blanches depuis la baſe juſqu'au milieu ſur le bord extérieur. Nulle différence entre les deux ſexes.

Cette eſpèce fait ſon nid de quelques brins de bois, ou de baguettes raſſemblées ſans art, communément dans le creux des arbres, et multiplie ordinairement deux fois par an. Les œufs, ainſi que dans toutes les eſpèces connues, ſont blancs et preſque toujours au nombre de deux, dont l'un donne pour l'ordinaire un mâle et l'autre une femelle. On dit qu'un autre pigeon, ſemblable à celui-ci, avec cette ſeule différence notable qu'il a le croupion blanc, fréquente les rochers et les falaiſes : mais eſt il une eſpèce différente ou non? C'eſt ce que je ne prétends pas déterminer. C'eſt de l'un ou l'autre de ces deux pigeons que proviennent toutes les variétés des pigeons de colombier, et quelques-unes de ceux de volière.

Voyez l'œuf Pl. XXIX. Fig. 2.

ORD. IV. GEN. I. PIGEON.

SPE. II. RING PIGEON.

Pl. 130.

Columba Palumbus. *Lin. Syſt.* I. p. 282.
Le Pigeon ramier. *Brif. Orn.* I. p. 89.

This ſpecies is much larger than the former, being near eighteen inches in length, thirty in breadth, and weighing about twenty ounces. The bill is yellowiſh: eyes pale yellow: head, back, and wing coverts bluiſh aſh colour; the back verging to brown: fore part of the neck paler aſh colour; the hind part and ſides of the neck a golden green gloſſed with blue and copper, changing its hues as it is variouſly objected to the light, and on each ſide of the neck is a creſcent of white: the lower part of the neck and breaſt are of a purpliſh red daſhed with aſh colour: the belly inclining to white: the tail aſh colour, changing to blackiſh at the end: the greater quill feathers are blackiſh, ſome of the outer ones having their exteriour edges white, and the reſt being aſh coloured: from the baſtard wing is a white ſtroke tending downwards.

This bird is known in ſome countries by the names of queeſt and cuſhat. It breeds in the woods, on the tops of pollard decayed trees, or in the hollows of them, making a looſe flat neſt with dry ſticks. It has two broods in a year, laying two eggs at a time, for which ſee Pl. XXIX. Fig. 3.

RING PIGEON. Wm Lewin del. & sculp. Published as the Act directs, Nov.r 1.1793

ORD. IV. GEN. I. PIGEON.

ESP. II. LE RAMIER.

Pl. 130.

Columba Palumbus. *Lin. Syſt.* I. p. 282.
Le Pigeon ramier. *Brif. Orn.* I. p. 89.

Cet eſpèce eſt plus grande que la précédente; ayant près de dix-huit pouces de long, trente de large, et peſant environ vingt onces. Le bec eſt jaunâtre: les yeux ſont d'un jaune pâle: la tête, le dos et les couvertures des ailes ſont d'un cendré bleuâtre; le dos tirant au brun: le devant du col eſt d'un cendré plus pâle; le derrière et les côtés du col ſont d'un verd doré luſtré de bleu et de couleur cuivrée, qui change ſelon les différentes expoſitions, et de chaque côté du col ſe trouve un croiſſant de couleur blanche: la partie inférieure du col et la poitrine ſont d'un rouge pourpré tacheté de cendré; le ventre tirant au blanc: la queue eſt cendrée et ſe change en noirâtre à l'extrémité: les grandes plumes des ailes ſont noirâtres; quelques-unes des plus extérieures étant blanches ſur leurs bords extérieurs, et le reſte couleur de cendre: à l'aile bâtarde commence un trait blanc dirigé en en-bas.

Le ramier eſt connu dans certains comtés ſous les noms de queeſt et de cuſhat. Il multiplie dans les bois, au haut ou dans les trous des vieux arbres ébranchés, faiſant un nid plat avec des buchettes sèches diſpoſées ſans art. Il y a deux couvées par an compoſées, chacune, de deux œufs.

Voyez l'œuf Pl. XXIX. Fig. 3.

ORD. IV. GEN. I. PIGEON.

SPE. III. TURTLE DOVE.

Pl. 131.

Columba turtur. *Lin. Syſt.* I. p. 284.
La Tourterelle. *Briſ. Orn.* I. p. 92.

This is the leaſt of the Britiſh ſpecies, being only twelve inches in length, twenty-one in breadth, and weighing four ounces. The bill is of a duſky blue colour: the eyes yellow: the back and wings reddiſh brown, the edges of the feathers approaching to aſh colour: the fore part of the wing aſh coloured: the quills duſky: the under parts of the body of a pale reddiſh hue, on the chin and belly nearly white: on each ſide of the neck is a patch of black feathers with white tips: the two middle feathers of the tail of a duſky brown, the reſt black, the ends and exterior ſides of the outmoſt white.

A variety is now and then met with, which differs in having almoſt the whole ſide of the neck covered with black feathers with a round ſpot of white near the end of each.

This ſpecies is wholly migratory with us, whereas the other two are but partially ſo. It builds on the thick buſhes in the woods and ſides of brooks, laying two eggs; and departs at the end of Auguſt or beginning of September.

For the egg, ſee Pl. XXX. Fig. 4.

TURTLE-DOVE. I.W.Lewin, del. et sculp.t Published as the Act directs, Nov.r 1.1795

ORD. IV. GEN. I. PIGEON.

ESP. III. LA TOURTERELLE.

Pl. 131.

Columba turtur. *Lin. Syſt.* I. p. 284.
La Tourterelle. *Brif. Orn.* I. p. 92.

Cet oiſeau eſt la plus petite eſpèce de pigeons que nous ayons en ce pays, n'ayant que douze pouces de longueur, vingt et un de largeur, et peſant quatre onces. Le bec eſt d'un bleu ſombre: les yeux ſont jaunes: le dos et les ailes ſont d'un brun rougeâtre, les bords des plumes tirant ſur le cendré: le devant de l'aile eſt cendré; les grandes plumes ſont de couleur ſombre: le deſſous du corps eſt d'un rougeâtre pâle, preſque blanc au deſſous de la tête et ſur le ventre: de chaque côté du col il y a une plaque de plumes noires terminées de blanc: les deux plumes du milieu de la queue ſont d'un brun ſombre, le reſte eſt noir, les extrémités et les côtés extérieurs des plus extérieures étant blancs.

Nous rencontrons de temps à autre une variété, qui différe en ce qu'elle a preſque tout le côté du col couvert de plumes noires, avec une tache ronde et blanche près de leur extrémité.

Cette eſpèce eſt entièrement de paſſage par rapport à nous, tandis que les deux autres ne le ſont qu'en partie. Elle place ſon nid ſur des buiſſons épais dans les bois ou le long des ruiſſeaux, et y dépoſe deux œufs. Elle nous quitte à la fin d'Août ou au commencement de Septembre.

Voyez l'œuf, Pl. XXX. Fig. 4.

1

2

3

4

1



2

3

4

J. Lewis, del. et sculp.t Published as the Act directs, Nov.r 7. 1793

T. Lewin, del. et sculp.t Published by the Act. directs, Nov.r 7 1798

1

2

4

3

T. Lenan, del. et sculp.t Published as the Act directs. Nov.r 7, 17[illegible]

T. Lewin del. et sculp. Published as the Act directs Nov.r 7 1792



2

3



4

T. Lemke del. et sculp. Publicité [illegible] Nov. [illegible], 1791

T. Robin del. et sculp.t Publish'd as the Act directs, Nov.r 7, 1796.

INDEX

TO THE

LINNÆAN NAMES OF THE BIRDS

IN THE

FOURTH VOLUME.

	Page.	Plate.
Caprimulgus europæus	68	128
Columba œnas	70	129
—— palumbus	72	130
—— turtur	74	131
Hirundo apus	66	127
—— riparia	64	126
—— ruſtica	60	124
—— urbica	62	125
Motacilla atricapilla	10-12	100-100*
—— hippolais	16	102
—— luſcinia	8	99
—— modularis	18	103
—— œnanthe	36	112
—— phœnicurus	20	104
Motacilla regulus	44	116
—— rubecula	30	109
—— rubetra	34	111
—— rubicola	32	110
—— ſalicaria	26	107
—— trochilus	40	114
—— troglodytes	42	115
Parus ater	50	119
—— biarmicus	58	123
—— cæruleus	54	121
—— caudatus	56	122
—— criſtatus	46	117
—— major	48	118
—— paluſtris	52	120

INDEX

TO THE

FOURTH VOLUME,

WHICH CONTAINS THIRTY-FIVE PLATES OF BIRDS, AND SEVEN OF THEIR EGGS.

	Page.	Plate.
Blackcap	10	100
——— female	12	100*
Martin, houſe	62	125
——— ſand	64	126
Nightingale	8	99
Pettychaps, greater	14	101
——— leſs	16	102
Pigeon	70-74	129-131
——— ring	72	130
——— ſtock	70	129
Redbreaſt	30	109
Redtail	20	104
Stone chat	32	110
Swallow	60-66	124-127
——— chimney	60	124
——— night	68	128
Swift	66	127
Titmouſe	46-58	117-123
——— bearded	58	123
——— blue	54	121
——— cole	50	119
Titmouſe, creſted	46	117
——— great	48	118
——— longtailed	56	122
——— marſh	52	120
Turtle dove	74	131
Warbler	6-44	98-116
——— Dartford	28	108
——— fantail	6	98
——— hedge	18	103
——— ſedge	26	107
Wheat-ear	36	112
Whin chat	34	111
White-throat	22	105
——— leſs	24	106
Wren, common	42	115
——— golden-creſted	44	116
——— reed	38	113
——— yellow	40	114

The References to the Eggs, the Plates of which are placed all together at the End of the Volume, will be found in the Deſcriptions of the Birds to which they belong.

END OF THE FOURTH VOLUME.

INDEX

DU

TOME QUATRIÈME,

QUI CONTIENT TRENTE-CINQ PLANCHES D'OISEAUX, ET SEPT AUTRES OÙ SONT FIGURÉS LEURS ŒUFS.

	Page.	Planche.
Chanteur	7-45	98-116
——— à queue d'éventail	7	98
Chantre de Dartford	29	108
Engoulevent	69	128
Fauvette	15	101
——— à tête noire	11	100
——— noire femelle	13	100*
——— babillarde	27	107
——— de haie	19	103
——— petite	17	102
Gorge-blanche	23	105
Grisette	25	106
Hirondelle	61-67	124-127
——— de cheminée	61	124
——— fenêtre	63	125
——— rivage	65	126
Martinet	67	127
Mésange	47-59	117-123
Mésange à longue queue	57	122
——— tête noire	51	119
——— barbue	59	123
——— bleue	55	121
——— de marais	53	120
——— grosse	49	118
——— huppée	47	117
Motteux	37	112
Pigeon	71-75	129-131
——— sauvage	71	129
Pouillot	41	114
Ramier	73	130
Roitelet	45	116
——— des roseaux	39	113
Rossignol	9	99
Rouge-gorge	31	109
Rouge-queue	21	104
Tarier	35	111
Tourterelle	75	131
Traquet	33	110
Troglodyte	43	115

Les Œufs figurés dans les Planches, que nous avons toutes rassemblées à la Fin du Volume, se trouveront aisément à l'Aide des Renvois placés au dessous des Descriptions des Oiseaux.

FIN DU TOME QUATRIÈME.

DIGEST OF THE

LIBRARY REGULATIONS.

No book shall be taken from the Library without the record of the Librarian.

No person shall be allowed to retain more than five volumes at any one time, except by special vote of the Council.

Books may be kept out one calendar month; no longer without renewal, and renewal may not be granted more than twice.

A fine of five cents per day incurred for every volume not returned within the time specified by the rules.

The Librarian may demand the return of a book after the expiration of ten days from the date of borrowing.

Certain books, so designated, cannot be taken from the Library without special permission.

All books must be returned at least two weeks previous to the Annual Meeting.

Each member is responsible for all injury or loss of books charged to his name.